
**- DOLORE
+ CONSAPEVOLEZZA**

***Valutazione del dolore nelle donne con
carcinoma alla mammella***

**O.N.Da – Osservatorio Nazionale sulla
Salute della Donna**


Metodo

500 interviste somministrate presso 49 reparti di oncologia italiani, a 3 diversi gruppi di pazienti:

- ✓ Donne sottoposte a mastectomia: N=64;
- ✓ Donne con malattia metastatica: N=257;
- ✓ Donne sottoposte a chemioterapia: N=88.


Le donne e il dolore fisico

"La patologia di cui soffre le procura o le ha procurato dolore fisico?"




(N=500, Casi Validi= 484, Non Risposte=16) numeri e % calcolate sul totale delle donne coinvolte

Le donne e il dolore fisico



Le donne e il dolore fisico



Le donne e il dolore fisico

Intensità del dolore fisico per profilo di donne:

- **Mastectomia= sì**

Valori più frequenti:

4 (16% dei casi validi)

8 (20% dei casi validi)

- **Malattia metastatica= sì**

Valori più frequenti:

4 (13,1% dei casi validi)

5 (26% dei casi validi)

6 (14,1% dei casi validi)

7 (13,1% dei casi validi)

- **Chemioterapia= sì**

Valori più frequenti:

4 (17,2% dei casi validi)


5 (17,2% dei casi validi)

8 (17,2% dei casi validi)

Le donne e il dolore fisico

Quale cura per il dolore fisico?

Sta facendo o in passato ha fatto qualche terapia per il controllo del suo dolore?



(N=500; Non Risposte=199)

Le donne e il dolore fisico

Quale cura per il dolore fisico?

Tipo di Farmaco per il dolore fisico

- Farmaci antidolorifici: 92,7%
- Prodotti alternativi: 1,7%
- Fisioterapia: 2,0%
- Altro: 3,7%
- Totale: 100%


(N=500; Non Risposte: 252)

Chi ha prescritto la cura per il dolore fisico


- Oncologo: 81,2%
- Medico di Famiglia: 14,4%
- Conoscente che soffre dello stesso dolore: 0,8%
- Farmacista: 0,0%
- Associazione di Pazienti: 0,0%
- Altro: 3,6%
- Totale: 100%

(N=500; Non Risposte: 250)

Le donne e il dolore fisico



Le donne e il dolore fisico



Le donne e il dolore fisico

Farmaci antidolorifici	Gruppo			
	Mastectomia	Tumore Metastatico	Chemioterapia	Tot.
	(N=13)	(N=167)	(N=17)	(N=197)
Oppiaceo forte ttd	0,00	19,16	11,76	17,26
Oppiaceo forte orale	0,00	25,15	11,76	22,34
Oppiaceo forte iv	7,69	0,60	0,00	1,02
Oppiaceo debole	15,38	28,14	17,65	26,40
Antidepressivo	7,69	1,20	5,88	2,03
FANS	61,54	25,75	52,94	30,46
Altro	7,69	0,00	0,00	0,51
Totale % intra-gruppo	100,00	100,00	100,00	100,00

Le donne e il dolore fisico

Tipologia di farmaco per intensità di dolore:

Bassa= 0-3; Media=4-6; Alta= 7-10.

Intensità del dolore = BASSA		Oppiaceo forte ttd	Oppiaceo forte orale	Oppiaceo forte iv	Oppiaceo debole	Antidepressivo	FANS	Totale
Profilo di pazienti	Mastectomia = Si	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00	100,00
	Malattia Metastatica = Si	12,12	45,45	0,00	18,18	0,00	24,24	100,00
	Chemioterapia = Si	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	50,00	100,00


Intensità del dolore = MEDIA		Oppiaceo forte ttd	Oppiaceo forte orale	Oppiaceo forte iv	Oppiaceo debole	Antidepressivo	FANS	Totale
Profilo di pazienti	Mastectomia = Si	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	66,67	100,00
	Malattia Metastatica = Si	24,42	15,12	1,16	38,37	0,00	20,93	100,00
	Chemioterapia = Si	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	50,00	100,00

Intensità del dolore = ALTA		Oppiaceo forte ttd	Oppiaceo forte orale	Oppiaceo forte iv	Oppiaceo debole	Antidepressivo	FANS	Totale
Profilo di pazienti	Mastectomia = Si	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	50,00	100,00
	Malattia Metastatica = Si	15,91	27,27	0,00	18,18	2,27	36,36	100,00
	Chemioterapia = Si	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	62,50	100,00


Le donne e il dolore fisico

Impatto negativo del dolore sulla vita quotidiana


IMPATTO DOLORE SUL QUOTIDIANO




Le donne e il dolore fisico




Le donne e il dolore fisico



Le donne e il dolore fisico



Le donne e il dolore fisico



Le donne e il dolore fisico

